

堕胎并发症

COMPLICATIONS OF TERMINATION OF PREGNANCY

所有手术都有潜在并发症。对于堕胎，大约百分之一会有一些手术并发症。轻微并发症明显比严重并发症常见。最常见的并发症有：

出血过多

手术时有时可能出现严重出血，很少需要住院（约五千分之一）。堕胎后可能出现持续出血（约二百分之一），通常无需特殊治疗。

残余组织

这种并发症导致严重子宫出血，伴随痛经。在手术时未能完全去除所有妊娠组织的情况下出现这种并发症（约二百分之一）。通常需要重复抽吸子宫。

感染

堕胎后，少数人可能引发子宫感染，很少出现输卵管感染（约二百分之一）。感染症状有异常疼痛、发烧和阴道分泌物，伴随或不伴随出血。经过适当治疗，不会影响未来受孕。

子宫穿孔

手术期间使用的一种器械可能穿透子宫内壁，导致一个小孔（约千分之一）。通常不是太大问题，可能需要住院观察。很少需要手术修复子宫内壁。

持续怀孕

有时，尤其是如果在怀孕非常早期进行手术的话，可能无法堕胎成功。如果堕胎后妊娠症状持续超过1周，应返回接受检查。

宫外孕

大约二百分之一会在输卵管受孕，而非子宫受孕。堕胎时，没有发现妊娠组织。如果确认输卵管受孕，需要住院进行堕胎。

宫颈损伤

宫颈损伤不超过1%。当怀孕早期（前三个月）由经验丰富的临床医生进行堕胎时几率更低。有时甚至没有外伤，在宫颈开口处可能形成粘连。这可能阻止月经，但是可以在我们任何一家中心通过稍微重新打开宫颈轻松治疗。

心理效应

只有少数女性堕胎后存在任何长期负面心理问题。术后感到一些消极情绪相当常见，通常堕胎前出现持续症状。另一方面，在堕胎失败的情况下，母子存在持久的消极影响。

其它风险

堕胎与乳腺癌之间的关系从未得到证实。也未证实堕胎与未来绝育之间存在任何关联。研究表明重复堕胎的女性，风险没有提高。然而，阿谢曼综合征是非常少见的妊娠子宫相关手术并发症（12-20周之间的流产或堕胎如果存在未诊断或未治疗的感染，更可能发生）。子宫内形成疤痕组织，可能防止月经和怀孕。妇科医生通常可以通过去除疤痕组织使子宫恢复正常功能进行治疗。绝育非常少见。

其它并发症

这些都很有见，其中包括麻醉剂的局部和静脉过敏反应。任何种类的手术均可发生，因此您有必要提供全部准确医疗详细情况。如果您进行静脉麻醉，预约前6个小时内不得进食任何食物或饮料，否则存在呕吐以及其它并发症的风险。

本并发症清单供您阅读，而非警告，但是确保您了解堕胎与任何其它手术一样，并不总是完全直截了当。只有经验丰富的医生才会为您进行手术，细心护理，以减少并发症风险。

堪培拉：1st Floor, Morisset House, 7 Morisset St, Queanbeyan 2620. 电话：(02) 6299 5559 传真：(02) 6299 5554

戈斯福德：Suite 4, 16-18 Hills St, Gosford 2250. 电话：(02) 4324 5176 传真：(02) 4322 9124

好市围：Suite 20, 4th Floor, 33 MacMahon St, Hurstville 2220. 电话：(02) 9585 9599 传真：(02) 9585 9716

纽卡斯尔：Suite 9, 24 Brown Rd, Broadmeadow 2292. 电话：(02) 4962 4999 传真：(02) 49624988

卧龙岗：Level 3, Cnr Keira and Market St's, 166 Keira St, Wollongong 2500. 电话：(02) 4227 4100 传真：(02) 4227 4122